



מידע
למטופלת



לפני המבחן

2 ימים	ללא תרופות אופיואידיות
3 ימים	ללא תרופות למניעת בחילות או עוויתות
8 שעות	לגימות מים קטנות בלבד
2 שעות	אין לאכול ולשתות
אין לבצע את הבדיקה בזמן הווסת	

ENDOSURE, Inc.
Phone: +1-443-391-7500
Email: info@endosure.com
Website: www.endosure.com



Phone: +972506910302
Email: elis@emd-endoisrael.com

מה קורה
במהלך בדיקת EVG?

- ההליך נמשך 30 דקות, כאשר נדרשות 10-20 דקות כדי להכין אתכם לבדיקה. הדבר אינו דורש הכנה מיוחדת או הרדמה כלשהי.
- אלקטרודות מונחות על העור (ייתכן שיידרש גילוח בנקודות אלקטרודה ספציפיות) והן תישארנה במקומן למשך הבדיקה.
- לאורך כל הבדיקה תתבקשו להישאר בשכיבה. יש ללבוש בגדים רפויים, ובמהלך הבדיקה יתכן שהבגדים יופשלו למטה על הירכיים ו/או מעל הצלעות התחתונות.
- יש לגשת לשירותים לפני תחילת הבדיקה מכיוון שלא ניתן לזוז לאחר תחילת הבדיקה. אם אתם מרגישים קר או חם מדי, ניתן לבקש שמיכה או לשנות את טמפרטורת החדר. היינו רוצים שתרגישו בנוח במהלך הבדיקה.
- בתחילה מבוצע מעקב בסיסי של האותות החשמליים במערכת העיכול שלכם במשך 10-15 הדקות הראשונות, למטרות השוואה.
- לאחר מכן מתבצעת בדיקת שובע בעומס מים. תתבקשו לשתות כוס מים במשך חמש דקות עד שתרגישו מלאים. אם תגיעו להרגשת שובע תוך פחות מחמש דקות, ניתן להסתפק בכך.
- במהלך 30 הדקות הבאות, האותות החשמליים של מערכת העיכול נרשמים, ולאחר מכן מסירים את האלקטרודות והבדיקה מסתיימת.

- בדיקה לא פולשנית 
- של 30 דקות 
- מדויקת ביותר 
- תוצאות מיידיות 

בדיקת Endosure היא כלי אבחון העושה שימוש בממצאים המגיעים מבדיקת EVG או אלקטרו-ויצרוגרמה. זהו הליך פשוט לא פולשני וללא כאבים בדומה לבדיקת אלקטרוקרדיוגרמה (א.ק.ג.). אלקטרוקרדיוגרמה מודדת את הפעילות החשמלית של הלב, בעוד אלקטרו-ויצרוגרמה מודדת את הפעילות החשמלית של הקיבה ודרכי המעיים. בדיקת EVG משמשת לסיוע באבחון הפרעות המשפיעות על התכווצות המעי הדק. התכווצויות אלו הינן מאד לא סדירות, ומלוות באותות חשמליים בתדר גבוה של מערכת העיכול, אשר מתאימות לנוכחות של אנדומטריוזיס.

האם ישנם סיכונים הקשורים לבדיקה זו?

אין סיכונים הקשורים לבדיקה זו. אין רכיבים מזיקים בצידוד המשמש למהלך הבדיקה. אנא הודיעו לטכנאי או לאדם המבצע את הבדיקה שלכם אם יש לכם אלרגיות כלשהן לדבקים.

האם אני יכולה לבצע את הבדיקה בזמן המחזור?

לא. כדי להבטיח תוצאות מדויקות, עלייך לתזמן את בדיקת ה-Endosure שלך שלא בזמן המחזור החודשי.

האם יש כאבים הקשורים לבדיקה זו?

אין כאבים הקשורים לבדיקה זו. הבדיקה לחלוטין אינה פולשנית. לא נעשה שימוש במחטים, ואין צורך לקבל דגימות של הדם או הרקמות שלכם. אין צורך בתרופות וגם לא בחומר הרדמה או הרגעה.

איזו הכנה נדרשת לבדיקה זו?

- 3 ימים לפני הבדיקה: אין ליטול תרופות למניעת בחילות או עוויתות*
- 2 ימים לפני הבדיקה: אין ליטול תרופות המכילות אופיואידים*

8 שעות לפני הבדיקה: אין לאכול או לשתות שום דבר אין לאכול דבר אחרי חצות הלילה בערב שלפני הבדיקה. ניתן ללגום לגימות קטנות של מים עד שעתיים לפני הבדיקה.

האם אפשר ליטול תרופה לפני בדיקת אלקטרו-ויצרוגרמה?

ניתן ליטול תרופות קריטיות, כגון המיועדות ללב, לחץ דם, נשימה או למניעת התקפים, עם לגימת מים בבוקר הבדיקה.



איך אקבל את התוצאות שלי?

למרות שהתוצאות זמינות באופן מיידי, יש לעבד ולשלוח אותן אל הרופא המזמין שלך. הרופא שלך ייצור איתך קשר עם הגעת התוצאות.

* תרופות העלולות להשפיע על בדיקה זו:

יש להפסיק נטילת תרופות פרו קינטיות כגון Reglan (metoclopramide), Motilium (domperidone), אריתרומיצין, Zelnorm (tegaserod) Bethanechol ותרופות נוגדות עוויתות כגון Bantyl (dicyclomine) Robinul - 3 או Donnatal, Levsin (hyocymamine) על בדיקה זו. יש להאט את תנועות המעי ועלולות להשפיע על בדיקה זו.

תרופות אלו כוללות: תרופות נגד כאבים כגון דמרול, קודאין, מורפיום, אוקסיקונטין, פרקוסט, פרקודן. יש להפסיק את נטילת התרופות הללו למשך יומיים (48 שעות) לפני בדיקה זו. רשימה זו אינה ממצה, ובכל מקרה של ספק, יש להתייעץ עם הצוות הרפואי בעת קביעת התור.

